



Patientvejledning

Labia reduktion

Labia reduktion

Labiareduktion er en operation, der mindsker de små kønslæber (labia minora). Der skal være en lægelig årsag til, at indgrebet foretages, da man i lovgivningen har besluttet, at denne operation ikke må udføres udelukkende af kosmetiske grunde.

Labia minora

Kvindens krop og dermed også hendes kønsorganer udvikles gennem hele livet. Man anser som hovedregel først kvinders kønsorganer som fuldt udviklet fra omkring 25-års alderen. Vi foretager derfor kun sjældent labiareduktion før denne alder.

Risici

Det er ikke uden risiko at få foretaget labiareduktion.

De hyppigste komplikationer er blødning, betændelse, nedsat følsomhed og kroniske smerter. Der kan komme senfølger i form af arvæv med skrumpning, så udseendet ikke forbliver pænt. Det kosmetiske resultat kan således ikke garanteres.

Patienttilfredshed efter indgrebet er > 90%.

Operation

Operationen udføres i lokal bedøvelse og varer ca. 20-30 min.

Efter operationen kan såret væske en del og danne en gullig sårskorpe, fordi der dannes meget lymfe. Dette er ikke tegn på betændelse.

Det kan foranledige en del ømhed.

Vævet falder til ro i løbet af en uge og smerterne fortager sig.

Du skal være specielt opmærksom på rødme og varme ved såret, dette kan være tegn på infektion, som muligvis kræver antibiotika.

Såret er fuldstændig helet efter ca. 2 uger.

Sygemelding

Vi anbefaler sygemelding i 1 uge.